# LISTA PRELIMINAR DE LAS *VERBENACEAE* EXISTENTES EN COLOMBIA CON ALGUNOS DE SUS USOS Y NOMBRES VULGARES

Por
SANTIAGO LÓPEZ-PALACIOS *

Debido a la buena acogida que tuvo mi libro Verbenaceae en Flora de Venezuela, concebí el proyecto de escribir las Verbenaceae de la Gran Colombia. Después de un trabajo de campo relativamente amplio en Colombia y Ecuador, me di cuenta de que lo proyectado era superior a mi edad y a mis ambiciones. De todo ello sólo quedaron unas Verbenaceae inéditas, para una Flora Genérica Colombiana, una Lista de Verbenaceae de la Gran Colombia y ésta, naturalmente provisional e incompleta, basada en registros hechos hace ya varios años, presentados ahora para corresponder una gentil invitación del Dr. PEDRO M. RUIZ y destinada al número especial de *Caldasia* con motivo del 50º aniversario de la fundación del Instituto de Ciencias Naturales.

## Aegiphila

1 Ae. alba Moldenke

N.v.*Totumillo blanco; Palo San Pablo,* Duque Jaramillo, Botánica General Colombiana: 373

Usos: Madera y leña

2 Ae. anómala Moldenke

Registro dudoso, sobre determinación de Mo. Bot. Gar. de *Gentry & Forero 7364;* más parece alguna forma de *Ae. integrifolia.*

---

* Departamento de Botánica - Facultad de Farmacia - Universidad Los Andes- Mérida (Venezuela).

3 Ae. bogotensis (Spreng.) Moldenke

N.v. *Queso fresco*, Cundinamarca

Usos: Leña

3a Ae. bogotensis fma. ternata Moldenke

3b Ae. bogotensis var. aequinoctialis Moldenke

4 Ae. bracteolosa Moldenke

5 Ae. caucensis Moldenke

6 Ae. cefalofora Stand.

7a Ae. cordata var. brevipilosa Moldenke

7b Ae. cordata var. colombiana Moldenke

Dudo de estas dos últimas determinaciones; los ejemplares en ellas colocados, por sus brácteas trífidas y por su indumento, me inclinan a considerarlas más bien pertenecientes a *Ae. fendleri* Moldenke.

8 Ae. costarricensis Moldenke

9 Ae. cuatrecasasi Moldenke

9a Ae. cuatrecasasi var. nitida Moldenke

10 Ae. deppeana Moldenke

N.v. *Sáuco de monte, Dungand 950* (NY)

11 Ae. elata Sw.

Sin N.v. registrado en Colombia; en Cuba se le conoce con el de *Gairo Santo.*

Usos: UPHOF dice que sus hojas son usadas contra úlceras, diarrea y disentería.

11a Ae. elata var. macrophylla (HBK.) López-Palacios
N.v. *Juan Grande, Romero Castañeda 6108* (NY)

12 Ae. elegans Moldenke

13 Ae. farinosa Moldenke

14 Ae. fendleri Moldenke

15 Ae. filipes Mart. & Schau.

16 Ae. glandulifera Moldenke

16a Ae. glandulifera var. pyramidata Rich. & Moldenke

En mi concepto los ejemplares colocados bajo esta denominación tienen más afinidad con *Ae. deppeana* que con *Ae. glandulifera*. Fuera de las glándulas no tiene con ésta nada en común. Para mayor información, remito a mi trabajo Notas preliminares para la Flora de Venezuela. Rev. Fac. Farm. ULA (1972), (12): 23 y 24.

17 Ae. grandis Moldenke (= *Ae. truncata* Moldenke; *Ae. goudotiana* Moldenke)

N.v. *Queso fresco*

Usos: Madera; sombrío de café

17a Ae. grandis var. cuatrecasasi (Moldenke) López-Palacios

17b Ae. grandis var. sessiliflora (Moldenke) Moldenke

N.v. *Totumo de cafetal, Duque Jaramillo 3553*. (COL)

Usos: Sombrío de café

18a Ae. hirsuta var. colombiana Moldenke

"MACBRIDE (1960) says: 'The var. *colombiana* Moldenke . . . from Putumayo near Perú is of curse more wideli distributed, but the trees may be referible to *A. ovata* Moldenke, the apparent differences certainly within the ranges of expected variation' ". Phytologia **25**: 230.

19 Ae. hirsutissima Moldenke

20a Ae. hoehni var. spectabilis Moldenke

21 Ae. integrifolia (Jacq.) Jacq.

N.v. *Aguapán, Little & Little 827; Tabaquillo*

Usos: Leña

21a Ae. integrifolia var. guianensis (Moldenke) López-Palacios

Usos: Construcciones caseras; leña

22 Ae. intermedia Moldenke

N.v. *Tabaquillo*.

Especie dudosa; creo que deba reducirse a Ae. integrifolia.

23 Ae. killipii Moldenke

24 Ae. laeta HBK.

25 Ae. laevis (Aubl.) Gmel.

26 Ae. lehmannii Moldenke

27 Ae. martinicensis Jacq.

N.v. *Totumillo calentano* y *Juan de la verdad*, DUQUE JARAMILLO, l.c.: 372

28 Ae. membranacea Turcz.

29 Ae. moldenkeana López-Palacios (con duda)

30 Ae. mollis HBK. (= *Ae. salutaris* Bompl.)
N.v. *Totumillo morado de cafetal; Palito de San Pablo,* DUQUE JARAMILLO, l.c.: 372; *Palo santo, Cuatrecasas 13839* (COL) Gorritos, *Duque Jaramillo 4401* (COL)

Usos: Alexitérica

30a Ae. mollis var. intermedia Moldenke

30b Ae. mollis var. longifolia (Turcz.) López-Palacios

30c Ae. mollis var. puberulenta (Moldenke) López-Palacios

31 Ae. montana Moldenke

32 Ae. novogranatensis Moldenke

33 Ae. odontophylla Donn. Sm. Este taxon, aplicado a los ejemplares colombianos es de dudosa interpretación. Hay quien lo considere endémico de Costa Rica. Habrá que reinterpretar entonces el material colocado bajo *Ae. aculeifera* Moldenke; *Ae. farinosa* Moldenke y *Ae. odontophylla* Donn. Sm.

34 Ae. panamensis Moldenke

35 Ae. pennelli Moldenke

36 Ae. peruviana Moldenke

37 Ae. quinduensis (HBK.) Moldenke

38 Ae. racemosa Vell.

39 Ae. reticulata Moldenke

Dudo mucho de la validez de esta especie, creada por el Dr. MOLDENKE de la colección única de MUTIS de material, inmaturo, y que no ha sido confirmada posteriormente.

40 Ae. smithii Moldenke

41 Ae. sufflaba Moldenke

42 Ae. sylvatica Moldenke. Sólo hay el tipo de Puerto Wilches. No confirmada por colecciones posteriores. MOLDENKE dice que es una especie muy anómala.

43a Ae. ternifolia fma. oppositifolia López-Palacios

44 Ae. vallensis Moldenke

El Dr. JORGE HERNÁN TORRES les señala además a los ejemplares de Ae. el uso de cercos vivos y los N.v. de *Saca ojo* en Antioquia; *Totumo* en el Tolima y *Soruro* en el Valle, pero sin indicar especies.

## Aloysia

45a A. scorodonoides var. orbicularis Moldenke

N.v. En sibundoy *Cidrón, M.L. Bristol 1257* (COL)

46 A. triphylla (L'Hérit.) Br. (= *Verbena triphylla* L'Hérit.; *Lippia citriodora* HBK.)

N.v. *Cidrón; Alegría; Luisa de Chile; Yerba Luisa.* Este último nombre se aplica también a otras plantas de olor semejante como *Lippia alba* (Mill.) N.E.Br. y *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf.

Usos: En perfumería y como medicinal (Digestiva y calmante nervioso, en decocción).

## Amazonia

47 A. arborea HBK

48 A. campestris (Aubl.) Moldenke

49 A. lasiocaulos Mart. & Schau.

50 A. sprucena Moldenke

No se les han registrado nombres vulgares, y algunas de las spp. del género fueron llevadas a Europa como ornamentales.

## Bouchea

Con pocos nombres vulgares para las spp.; generalmente se conoce como *Verbena,* nombre que también se le da a *Hierobotana, Stachytarpheta,* y naturalmente a *Verbena.* Está representada así:

51 B. boyacana Moldenke

52 B. notabilis Moldenke

53 B. prismatica (L.) Kuntze

N.v. *Rabo de zorro,* Cauca, YEPES AGREDO 1193 (COL); y según GARCÍA BARRIGA Flora Medicinal de Colombia II: 497, *Arrocillo* (Bolívar); *Verbena de Castilla* (Tolima): *Verbena negra* (Valle).

Usos: GARCÍA BARRIGA, l. c.: "En decocción como desinfectante y como emoliente en forma de baños o en cataplasma de las hojas. La decocción de las hojas en lavados rectales en las fiebres palúdicas y en el tifo".

53a B. prismatica var. brevirostra Grenz.

Usos: los de la especie típica. G.B. Ut supra.

53b B. prismatica var. longirostra Grenz.

## Citharexylum

54 C. bullatum Moldenke

55 C. caudatum L.

56 C. dryanderae Moldenke

57 C. karsteni Moldenke

N.v. *Negrito* (Ubalá); *Agracejo,* (Cáqueza), *Triana 262; Uribe 4829*

57a C. karsteni fma. dawei Moldenke

N.v. *Tibaquí chiquito* (Boyacá)

57b C. karsteni var. lanceolatum Moldenke

N.v. *Huesito; Maíz tostado* (Huila, Río Venado). *Little 9058* (COL)

58 C. kunthianum Moldenke (= *C. tomentosum* HBK.)

N.v. *Pendo* (Nariño y Cauca); *Palo blanco* (Cauca, La Paila) *Triana 3738-19* (COL)

Usos: Madera en bruto para pequeñas construcciones; cercas vivas.

59 C. macroclamys Pittier

60 C. macrophyllum Poir.

61 C. mirifolium Moldenke

62 C. montanum Moldenke

N.v. *Carrasposo, Duque Jaramillo 3933,* quien también le da el nombre de *Palo cuadrado bogotano; Casposa* (Huila) *Little 8989.*

Usos: Sombrío.

63 C. poeppigii Walp.

N.v. *Totumo* (Casanare); *Totumo de monte* (Tauramena) *Uribe 4049* (COL); (Meta), *Mesa, Idrobo y Fernández 303* (COL), Villavicencio.

63a C. poeppigii var. calvescens Moldenke

63b C. poeppigii var. margaritaceum Moldenke

64 C. reticulatum Moldenke

Muestras estériles adjudicadas a este taxon parecen ubicarse mejor en *C. ulei* var. *obovatum.*

65 C. spinosum L.

Tomo de mi Lista de VERBENACEAE de los países de la Gran Colombia: "Aunque en mis registros no aparece para Colombia, DUQUE JARAMILLO en su Diccionario de la Flora Industrial Colombiana-Botánica General Colombiana: 367, lo señala bajo el nombre vulgar de *Palo cuadrado*".

66 C. subflavescens Blake

N.v. *Uruape* (Cundinamarca, Bogotá) *Duque Jaramillo 2955* (COL).

67 C. subthyrsoideum Pittier.

Poco registrado para Colombia, aunque DUQUE JARAMILLO, 1 c. lo trae como *Palo guitarra*. El único registro colombiano, *Triana 299* (BM) parece dudoso

68 C. sulcatum Moldenke

68a C. sulcatum var. hirtellum Moldenke

69 C. ulei Moldenke

69a C. ulei var. obovatum Moldenke

N.v. *Totumero*

Usos: Cercos vivos y estacones.

70 C. vallense Moldenke

El nombre de *Palo guitarro (a)* para algunas especies, corresponde al significado exacto del nombre genérico *(Citharexylum)*; en épocas remotas su madera se empleaba para la construcción de instrumentos musicales (violines, tiples, cuatros y guitarras), pero parece que ya no tiene este uso. PÉREZ ARBELÁEZ, Plantas Utiles de Colombia, Tercera Redacción, 1956, señala el *C. fruticosum* bajo el nombre de *Teuro,* pero ni este taxon ha sido registrado en Colombia, ni yo he oído allí tal nombre vulgar. Tampoco aparece en la edición anterior la de la Contraloría General de la República, 1947, en donde lo trae bajo *Palo guitarro.*

## Clerodendrum

71 C. bungei Steud. Fide MOLDENKE Fifth Sumary . . . :115

72 C. molle HBK.

73 C. paniculatum L.

74 C. philipinum Schau. (= *C. fragrans* var. *pleniflorum* Schau.)

N.v. *Jazmín de oriente, según* PÉREZ ARBELÁEZ; *Marbella, Uribe 1415* (COL); *Margamela* (Valle, Candelaria) *Viloria R. 30; Diamela de perro* (Valle, Cali) *Zambrano 5* (COL)

Usos: a veces como ornamental

75 C. pittieri Moldenke

76 C. speciosissimum Van Geert
Usos: Ornamental

77 C. ternifolium HBK.

77a C. ternifolium var. velutinosum Moldenke
N.v. *Jazmín* (Ibagué) *Echeverri 2537* (IB)

78 C. tessmanni Moldenke

79 C. thonsonae Balf. f.
N.v. *Lágrimas de Obando* y *Corazón herido*
Usos: Jardínico.

80 C. ulei Moldenke, para *Haught 4681;* debe reexaminarse este ejemplar.

81a C. umbellatum var. speciosum Moldenke
N.v. *Corazón herido.*

Usos: ornamental.

## Cornutia

Género maderable y ornamental

82a C. australis var. occidentalis Moldenke

83 C. microcalycina Pavón & Moldenke

83a C. microcalycina var. anómala Moldenke

83b C. microcalycina var. pulverulenta Moldenke
N.v. *Culape* (Nariño, Isla de Gallo) *Dryander 2543* (NY)

84a C. odorata var. calvescens Moldenke

84b C. odorata var. colombiana Moldenke

N.v. *Culape, Juan Culape* (Nariño, Barbacoas) *Triana 36* (COL); *Salvio Lugo* (Cundinamarca, Caparrapí) *García Barriga 7671* (US)

## Duranta

Género principalmente ornamental; ocasionalmente se usa para cercos vivos y su madera se emplea domésticamente para cabos de herramientas, principalmente de martillos.

Según ROGER W. SANDER, Provisional synopsis of the species and natural hybrids in *Duranta* (Verbenaceae), *Sida* **10** (4). 308-318. 1984, sólo quedarían como taxa válidas para Colombia D. *repens* L.; *D. obtusifolia* HBK (= *D. coriacea* Hayek); *D. mutisii* L.f.; *D. mandoni* Moldenke; *D. sprucei,* que incluiría todas sus variedades y además *D. tomentosa* Hayek; *D. triacantha* Moldenke y *D. woronowii* Moldenke. Sin embargo yo me atengo todavía al criterio de MOLDENKE, quien registra los siguientes, que colectivamente reciben los nombres de *Espino* o de *Guapante*

85 D. coriacea Hayek

N.v. *Guapante silvestre,* J. A. URIBE: Flora de Antioquia; *Totocal* (Cauca, Popayán) *Fernández Pérez 1760* (COL), (Huila) *Romero Castañeda 6560* (COL); *Cabo de monte* (Cundinamarca, Salto de Tequendama) *Duque Jaramillo 3667* (MEDELL); *Adorote* (Valle, carretera al mar) *Dryander 2364* (COL)

86 D. mandoni Moldenke

87 D. mutissii L.f.

N.v. *Espino blanco* (Cundinamarca, Salto de Tequendama) *Duque Jaramillo 3177; Espino negro* (Cundinamarca, Tabio) *Duque Jaramillo 2688; Espino* (Bogotá) *Orjuela Navarrete s.n.; Guayavito espino* (Sabana de Bogotá) *Pérez Arbeláez s.n.* (COL) *Cúcano* (Norte de Santander, Mutiscua-Calderas) *López-Palacios 3599* (MERF); *Cucas* (N. de S., Ocaña) *Triana 3709* (COL)

88 D. repens L.

N.v. *Guapante; Espino* (Ant., Medellín) *Bernardo Vásquez,* colección *Hno. Daniel 4003* (MEDELL); *Adonis; Garbancillo* (Magdalena, Santa Marta) *Pérez Arbeláez s.n.* (COL); *Guacharaco* (Valle, Buga) *Dryander 2650* (VALLE)

88a D. repens var. alba (Masters) L.H. Bailey

88b D. repens var. canescens Moldenke

88c D. repens var. lopez-palacii Moldenke

(SANDERS no reconoce ninguna de estas variedades)

89 D. rupestris Hayek (considerado por SANDERS como un híbrido de de D. mandoni x D. armata)

90 D. sprucei Moldenke

N.v. *Mabi-i-subja* (Valle de Sibundoy) *Bristol 868; Fruta de tórtola; Guapante tieso; Adoróte* (Valle, Río Cali) *Duque Jaramillo 3859* (COL)

90a D. sprucei var. breviracemosa Moldenke

90b D. sprucei var. colombiana Moldenke

91 D. tomentosa Hayek

92 D. triacantha Moldenke

N.v. *Espino, Guapante* y *Cruceto,* Flora de Antioquia: 291

93 D. woronowii Moldenke

## Hierobotana

94 H. inflata (HBK) Briq.

N.v. *Verbena*

## Holmskioldia

95 H. sanguinea Retz.

N.v. *Bonete chino,* PÉREZ ARBELÁEZ, P. Utiles, Ed. 1956: 741; *Sombrerito chino,* (Ibagué) CARLOS QUIMBAYO *42* (IB)

Usos: Aunque exótica se ha cultivado y aclimatado ampliamente como ornamental.

## Lantana

96 L. achyranthifolia Desf.

97 L. armata Schau.

N.v. *Gurupacha* (Cauca, El Tambo) *García Barriga 4454* (COL); yo, en la misma localidad, la registré como *Murupacha, López-Palacios 3717* (COL); *Venturosa* (Chilupo, Chocó), *Romero Castañeda 6279* (COL), (Ibagué) *José Correal 22* (IB); (El Cerrito-Palmira) *García Barriga 6432* (COL); y en Antioquia *Tango.*

97a L. armata var. velutina Moldenke

98 L. camara L.

N.v. *Venturosa; Sanguinaria*, Flora de Antioquia: 292; el Hno. APOLINAR MARÍA, Vocabulario de Términos vulgares, agrega los de *Carrasposa* (Nº 1741) y *Carrasquillo* en Bucaramanga (Nº 1744). PÉREZ ARBELÁEZ dice, o.c.: 745: "Sus nombres vulgares son *Zorrito*, La Mesa; *Huesito, Curaverrugas* (Antioquia); *Cariaquito* (Putumayo); *Sanguinaria* (Boyacá). Sus flores son muy melíferas buscadas por abejas y colibríes. *L. camara* L. es la más cultivada en Europa. Esta tiene flores rojas y amarillas, variables, y por eso en Méjico las apodan *palabra de mujer*".

Usos: "En el Valle de Tenza para tratar a los niños anémicos", PÉREZ ARBELÁEZ. "La decocción de las hojas en resfriados y afecciones del estómago". Flora de Antioquia 292. "En el Tambo, utilizan la decocción de toda la planta para facilitar los partos. Según SALVADOR CALDERÓN y PAÚL C. STANDLEY (1944), la decocción de las hojas de esta especie es usada en el Salvador como remedio en casos de fiebres, fríos y heridas. La decocción de la raíz para purificar la sangre y en enfermedades hepáticas. Las flores y la raíz también se emplean como expectorantes en la bronquitis, la tos y el asma. Las flores en baños se emplean en las várices. Toda la planta en infusión se usa como emenagogo y antiséptico.

"M. J. VAN STEENIS-KRUSEMANN (1953:49) indica que las hojas en decocción de esta especie son diaforéticas, antiespasmódicas y facilitan la digestión". GARCÍA BARRIGA, o.c. II:500.

98a L. camara var. flavens (Medic.) Moldenke
Usos: Ornamental.

98b L. camara var. mista (L.) L.H. Bailey

98c L. camara var. moritziana (Otto & Dietr.) López-Palacios

N.v. *Venturosa, Cariaquito* y *Sanguinaria*. Los dos últimos para Cundinamarca, *García Barriga 323* (COL) y para el Chocó *Fernández 250* (COL).

Usos: como la especie típica.

98d L. camara var. moritziana fma. parvifolia Moldenke

98e L. camara var. mutabilis Moldenke
Usos: Ornamental

98f L. camara var. splendens (Medic.) Moldenke
Usos: ornamental

99 L. canescens HBK

N.v. según GARCÍA BARRIGA, o.c.: 502, *Zorillo* en Cáqueza; *Venturosa* en otras partes

99a L. canescens var. integrifolia Moldenke

Sobre *García Barriga 10615* (COL). Quizá se trate de una forma anómala, pues no ha sido confirmada con colecciones posteriores.

100 L. chamissonis (D. Dietr.) Benth.

101 L. colombiana López-Palacios

102 L. cujabensis Schaud.
N.v. *Carrasquillo* en Puerto Wilches, fide GARCÍA BARRIGA, o.c.: 505; pero en mis registros este taxon no aparece para Santander.

103 L. fucata Lindl.

N.v. *Arrocillo* (Boyacá) *Yepes Agredo 3207* (COL); *Maizorro, Forero & López 440* (COL); *Cancherina* (Cauca) *López-Palacios & Idrobo 3757* (COL)

104 L. glandulosissima Hayek

105 L. glutinosa Poepp.

N.v. *Karasauta* (Guajira) *Saravia y otros 3629; Venturosa* (Tolima) *Alirio López 24* (IB); *Venturosa amarilla* y *Venturosa espinosa* (Valle) *Duque Jaramillo 4031A* y *4032* (COL)

106 L. haugthii Moldenke

106a L. haugthii var. obtusibracteata Moldenke

106b L. haugthii var. parviflora Moldenke
Este taxon, con sus variedades, merece nuevo estudio.

107 L. lopez-palacii Moldenke

108 L. maxima Hayek

N.v. *Venturosa.* (Valle), fide GARCÍA BARRIGA, o.c.: 505

109 L. rugulosa HBK

109a L. rugulosa fma. parvipedunculata Moldenke

El Dr. MOLDENKE en 25.5.76 propone que esta forma se cambie a *L. colombiana*

110 L. salicifolia HBK.
Ojo: ¡Esta planta, si no se ha extinguido, está en peligro de serlo!

111 L. tomasii Moldenke

112 L. trifolia L.

N.v. por lo general *Venturosa; Verbena de conejo* en Bolívar, *Romero Castañeda 10028* (COL); y según el Hno. APOLINAR MARÍA, *Carrasposa en Sasaima*, o.c.: 1742, basado posiblemente en el ejemplar del Hno. *Antonio Camilo 3563* (COL)

112b L. trifolia fma. opositifolia Moldenke

## Lippia

113 L. alba (Mill.) N.E. Br.

N.v.: Transcribo de mi Lista de *Verbenaceae* de la Gran Colombia: "En Colombia se le conoce como *Prontoalivio,* aplicado en obra de PÉREZ ARBELÁEZ, posiblemente por error a *Lantana canescens* L. (sic). Aunque los dos taxa en material de herbario son semejantes y *Lantana canescens* Hort. es un sinónimo de *Lippia alba,* nunca lo he oído aplicado a la verdadera *Lantana canescens* HBK, pero la ilustración dada por PÉREZ ARBELÁEZ (1956) corresponde claramente a una *Lantana* y no a una *Lippia*. En la edición de 1947 la misma ilustración tiene este título: Lantana sp. rugulosa HBK. Valga la oportunidad para anotar que al ilustre autor, además de la mala atribución a LINNEO de *Lantana* canescens, se le deslizaron algunos otros errores en los dibujos de las Verbenaceae de la mencionada obra (cito los números de la edición de 1956): el 742 por sus hojas pecioladas más parece corresponder a *Petrea aspera* Turcz. que a *Petrea arborea* HBK.; el 743 atribuido a *Petrea volubilis* Jacq. (sic) corresponde a una *Congea*, y el 744, como de *Verbena* R & P., es de una *Stachytarpheta*".

GARCÍA BARRIGA agrega los de *Oregano de cerro* para el Magdalena y el de *Curalotodo* para otras partes

Usos: GARCÍA BARRIGA, o.c.: 506: "Esta especie se ha empleado como estomacal y antiespasmódica en infusión teiforme. También se ha usado como sedante; en la diabetes, como desinfectante en forma de baños; diaforética y emenagoga". LINDA LEIGH GLEMBOSKI. The etnobotany of the Tukuna Indians, Amazonas, Colombia: 50: "For headeache, the leaves are crushed in water, and the head is bathed in liquid.

"A leaf decoction is given in one-hal cup doses three times daily for diarrhea. The leaves also are mixed those of *Menta* (aff, *viridis*) and boiled to make a decoction wich is taken for diarrhea"

113a L. alba var. globiflora (L'Hérit.) Moldenke

114 L. americana L

N.v. *Guasgüín* e *Indio viejo.* Cuervo Márquez la llama Salvia de *tierra caliente*

García Barriga, entre las págs. 506 y 507 trae una buena fotografía citada bajo su sinónimo. *L. hemisférica* Jacq. El ejemplar de *Karsten s.n.,* que aparece citado en Phytologia 12:80 como de localidad indeterminada (Dibulla, Río Hacha), es de Colombia: Dibulla, Rio Hacha, en la Guajira.

114a L. americana fma. hyptoides (Benth.) Moldenke

López-Palacios 4016 (MERF) sería el primer registro para Colombia

114b Lippia americana fma. pilosa Moldenke

N.v. *Velita* (Atlántico)

Usos: emenagoga y diaforética, García Barriga: 507

115 L. hirsuta L.

N.v. *Salvio (a) blanco (a)* (Cundinamarca) *y Bunquín* (Boyacá). El Dr. Jorge Ignacio del Valle, en su Introducción a la Dendrología Colombiana: 275, le da los de *Gallinazo* o *Neblino,* que posiblemente se apliquen también a la antigua variedad. *L. hirsuta* var. *glabrescens* Moldenke, conocida hoy como *L. schlimii* var *glabrescens* (Moldenke) Moldenke

Usos: vigas

115a L. hirsuta var. moritzii Moldenke

Usos: maderable

116 Lippia micromera Schau.

Usos: Condimento

117 L. origanoides HBK.

N.v. Según García Barriga, o.c.: 508: *Orégano cimarrón* (Guajira); *Orégano de cerro* (Magdalena) *Orégano* (Cauca) y *Orégano ancho* (Cúcuta)

Usos: "Hojas en infusión como expectorante a más de ser eficaces en toda clase de afecciones bronquiales y pulmonares; son además recomendadas contra el asma, la tos de los tuberculosos y también como estomáquico, antiespasmódico y emenagogo", García Barriga: 508

118 L. schlimii Turcz.

Usos: vigas

118a L. schlimii var. glabrescens (Moldenke) Moldenke

N.v. *Sacaojo* y *Gallinazo* (Antioquia) *Cabrera 171* (MEDELL); *Cancha* (Cundinamarca) *Echeverri 1674* (IB)

Usos: Viguetas y alfardas

### Petitia

119 P. dominguensis Jacq.

N.v. *Capá*

Cultivada en la Granja experimental de Chinchiná

### Petrea

120 P. arborea HBK

N.v. *Chaparro* y *Pluma de la reina,* y según el Hno. APOLINAR MARÍA, *Arguaco, Cucharo, Azulina* y *Jazmín azul,* o.c. Nos. 465 y 616. Este taxon a veces se presenta como escandente y muchos lo confunden con *Petrea volubilis* L., no existente en Colombia. Esto creo que haya acontencido con el mismo Hno. APOLINAR MARÍA, No. 617, en donde da para *P. volubilis* los nombres de *Azulina, Azulito, Chaparrito* y *Jazmín real.*

Usos: ornamental, como todas las spp. del género.

121 P. aspera Turcz.

N.v. *Chaparrito* y *Pluma de la reina,* que se les dan a todas las P. de Colombia

122 P. atrocerulea Moldenke

123 P. colombiana Moldenke

124 P. maynensis Huber

125 P. peruviana Moldenke

126 P. pubescens Turcz.

127 P. riparia Moldenke

128 P. rivularis Moldenke

129 P. rugosa HBK.

N.v. El Hno. APOLINAR MARÍA, o.c. Nº 619, registra los siguientes nombres: *Azulito* (Tolima); *Chaparrito* (Popayán); *Chicharrón* (Buga); *Copo morado* (Cartago); *Pluma de la reina; Plumito* (Medellín) y el de *Mayadena* (Honda, sub *P. obtusifolia*). Quizás se le puede agregar el de *Mamoncillo*, que traen RECORD & HESS, pág. 545, y sin quizás los de *Pavita* (Cundinamarca, La Esperanza), *Plumilla* (Santander de Quilichao, Valle) registrados por mí y los *Sombrerito* y *Azulino carrasposo* por DUQUE JARAMILLO y *Azulina* por CORREA ORJUELA para Cali.

129a P. rugosa var. casta Moldenke

130 P. scaberrima Moldenke

## Phyla

131 Ph. betulifolia (HBK.) Greene

132 Ph. nodiflora (L.) Greene

132a Ph. nodiflora var. longifolia Moldenke

132b Ph. nodiflora var. reptans (HBK.) Moldenke

133 Ph. scaberrima (A.L. Juss.) Moldenke

N.v. *Orozús* (Antioquia) *López-Palacios 3574* (COL), (Cauca) *López-Palacios e Idrobo 3723* (COL) y también en otros lugares; *Menta* (Nariño, Barbacoas) *Mora 2288* (COL)
Usos: En Africa se usa como hemostática. UPHOF. En otras partes como estomacal.

## Priva

134 P. lappulacea (L.) Pers.

N.v. *Cadillo de bola; Cadillo de bolsa; Cadillo forrado; Cadillo pegajoso; Sácalotodo*
Usos: Hojas diuréticas, *Sarmiento 9* (COL)

134a P. lappulacea fma. albiflora Moldenke

## Stachytarpheta

135 S. angustifolia (Mill.) Vahl

135a S. angustifolia fma. elatior (Schard.) López-Palacios

136 S. canescens HBK.
N.v. *Verbena* (Tolima) *Echeverri 339* (IB)

137 S. cayennensis (L. C. Rich.) Vahl (Incluidas *S. australis* Moldenke y *S. dichotoma* R. & P.)

N.v. *Verbena* (Tolima), *Echeverri 32 y 237* (IB); en otras partes *Verbena negra,* (Valle) fide GARCÍA BARRIGA.

Usos: "Esta especie se utiliza en el Valle del Cauca, en forma de decocción de toda la planta, en lavados rectales, también en zumo en dosis de 2 copitas diarias, y aún más, especialmente en las diarreas, fiebres gástricas y en el tratamiento de las fiebres tifoideas y en el tifo. Es gran desinfectante, antivulnerario y emenagogo", GARCÍA BARRIGA: 509. En el Brasil, como hipoglucemiante.

137a S. cayennensis fma. albiflora Moldenke

138 S. jamaicensis (L.) Vahl

139 S. mutabilis (Jacq.) Vahl

N.v. *Rabo de zorro* (Mariquita) *García Barriga 510* (COL)

139a S. mutabilis var. violacea Moldenke.

Esta variedad posiblemente sea la misma típica modificada por efectos de pH.

140 S. orubica (L.) Vahl

N.v. *Verbena morada; Rabo de perro* (Sucre, Sincelejo) *Hernández 38* (MEDELL)

141 S. prucei Moldenke

142 S. straminea Moldenke

A duras penas diferenciable de la *S. cayennensis,* de la cual parece forma, que no especie separable

N.v. *Verbena* (Anolaima); *Verbena negra* (Tolima), fide GARCÍA BARRIGA: 511

143 S. trinitensis Moldenke

## Tectona

144 T. grandis L.

N.v. *Teca* o *Teka*

Usos: maderable

144a T. grandis fma. pilosula Moldenke

N.v. y usos como la sp. típica.

## Verbena

145 V. brasiliensis Velloso

146 V. glabrata HBK.

147 V. hybrida Vossl.

N.v. *Verbena de jardín* (Cundinamarca) *Julio A. Olaya 80* (IB)

Usos: ornamental

148 V. litoralis HBK.

N.v. *Verbena; Verbena blanca,* nombre éste con que se le distingue de algunas *Stachytarphetae,* en especial de *S. cayennensis*; a los que deben agregarse los de *Verbena chiquita* y *Espina de raya,* que GARCÍA BARRIGA, o.c. 511 y 512 señala para la *V. hispida* R. & P., taxon no señalado en Colombia y de imposible ocurrencia en los Llanos Orientales de Colombia. Las dos citas que allí se aducen para tierras altas, corresponden la una, *Pérez Arbeláez 1207* a *V. valerianoides* HBK., y la otra, *Triana 3685* a *V. trifida* HBK.

Usos: Con el respeto y consideración debidos, sigamos citando al Dr. GARCÍA BARRIGA: 513: "Esta especie de *Verbena* y quizás otras más, que vive como maleza (ruderal) en los potreros y prados, se usa en forma de decocción o de infusión y en dosis de 10 a 20 gramos de planta seca en 200 de agua, como febrífugo en la tifoidea y en las fiebres gástricas. Administrando la decocción en lavados rectales o en forma de tisana es un buen remedio contra el tifo. La raíz de la verbena en forma de zumo se emplea en el Valle del Cauca, contra el colerín. Sus hojas y tallos macerados en agua fría durante la noche y en dosis de un pocillito en ayunas se utilizan en los estados biliares, jaquecas y enfermedades hepáticas. Según Santiago Cortés, las especies de Verbena son muy útiles en el tratamiento de la fiebre amarilla y de la tifoidea y usadas comúnmente como diaforéticas, antipútridas y tónicas.

"Las flores en decocción se han empleado para corregir los desórdenes de la menstruación y como tónico del útero".

148a V. litoralis var. albiflora Moldenke

149 V. monacensis Moldenke

150 V. officinalis L.

Aparece citada en el Fifth Sumary . . . : 120 para el Valle del Cauca, pero seguramente debe tratarse de algún ejemplar cultivado

151 V. trifida HBK.

N.v. *Cinamomo, Triana 3685* (COL)

Usos: ornamental

152 V. valerianoides HBK.

N.v. *Verbena negra*

Aunque GARCÍA BARRIGA cita a *V. hispida* R. & P. y a *V. bonariensis* L. no creo que existan en Colombia.

### Vitex

Todo el género suministra buena madera y sus flores son melíferas

153 V. callothyrsa Sandw.

154 V. capitata Vahl

N.v. *Aceituno* (Bolívar, Palotal) *Romero Castañeda 1636* (COL)

155 V. columbiensis Pittier

N.v. *Totumillo costeño,* según DUQUE JARAMILLO; *Aceituno* en Bolívar. En la región de Urabá posiblemente sea a esta especie a la que se le denomine *Trúntago* (*negro;-blanco;-taná*), JORGE IGNACIO DEL VALLE, o.c.: 275.

156 V. compressa Turcz.

N.v. *Aceituno* (Guajira, Carraipía) *Romero Castañeda 4419* (COL)

157 V. cymosa Bert. ex Spreng.

N.v. *Aceituno* (Payandé) *J. Perdomo 98* (IB)

158 V. divaricata Sw.

159 V. flavens HBK.

160 V. klugii Moldenke

N.v. *Maporí* (en idioma tukano, Vaupés) *Romero Castañeda 3769* (COL)

161 V. masoniana Pittier

162a V. orinocensis var. multiflora (Miq.) Huber

N.v. *Aceituno* y *Guarataro* en Arauca; en tunebo se le da el nombre de *pao-kera, López-Palacios 2960* (MERF)

163 V. parvifolia A. L. Juss.

164a V. sprucei var. vaupesensis Moldenke

165 V. staheli Moldenke

166 V. triflora Vahl.

No seguro, pero de posible ocurrencia en la Amazonia colombiana.

## NOMBRES VULGARES

Aceituno 154 a 157 y 162a
Adonis 88
Adorote 85, 90
Agracejo 57
Aguapán 21
Alegría 46
Arguaco 120
Arrocillo 53, 103
Azulina 120, 129
Azulino carrasposo 129
Azulito 120, 129
Bonete chino 95
Bunquín 115
Cabo de monte 86
Cadillo de bola 134
— de bolsa 134
— forrado 134
— pegajoso 134
Cancha 118a
Capá 119
Carrasposa 98, 112
Carrasposo 62
Carrasquillo 98, 102
Cidrón 45a, 46
Cinamomo 151
Copo morado 129
Corazón herido 79, 81a
Cruceto 92
Cúcano 87
Cucas 87
Cucharo 120
Culape 84b
Curalotodo 113
Chaparrito 120, 121, 129
Chaparro 120
Chicharrón 129
Diamela de perro 74
Espina de raya 148
Espino 87, 88, 92
Espino blanco 87
— negro 87
Fruta de tórtola 90
Garbancillo 88
Gairo santo 11
Gallinazo 115, 118a
Guacharaco 88
Guapante 88, 92
— silvestre 86
— tieso 90
Guarataro 162a
Guasgüín 114
Guayabito espino 87
Gurupacha 97
Huesito 57b
Indio viejo 114
Jazmín 77a
— de oriente 74
— real 120
Juan culape 84b
— de la verdad 27
— grande 11a
Karasauta 105
Lágrimas de Obando 79
Luisa de Chile 46
Mabi-i-subja 90
Maizorro 103
Maíz tostado 57b
Mamoncillo 129
Maporí 160
Marbella 74
Margamela 74
Mayadena 129
Menta 133
Murupacha 97
Neblino 115
Negrito 57
Orégano 117
— ancho 117
— cimarrón 117
— de cerro 113, 117

Palito de San Pablo 30
Palo blanco 58
— cuadrado 65
— — bogotano 62
Palo guitarra 67, 70
— guitarro 70
— San Pablo 1
— santo 30
Pao-kera 162a
Pavita 129
Pendo 58
Pluma de la reina 121, 129
Plumilla 129
Plumito 129
Prontoalivio 113
Queso fresco 3, 17
Rabo de zorro 53, 139
Sacalotodo 134
Sacaojo 44, 118a
Salvia(o) blanca(o) 115
— de tierra caliente 114
Salvio lugo 84b
Sanguinaria 98, 98c
Sauco de monte 10
Sombrerito 129
— chino 95
Soruro 44
Tabaquillo 21, 22
Tango 97
Teca o Teka 144
Totocal 86
Totumero 69a
Totumillo blanco 1
— calentano 27
— costeño 155
— morado de cafetal 30
Totumo 44, 63
— de cafetal 176
— de monte 63
Trúntago 155
— blanco 155
— negro 155
— taná 155
Uruape 66
Velita 114b
Venturosa 97, 98, 98c, 99, 105 108, 112
— amarilla 105
— espinosa 105
Verbena 51, 94, 136, 137, 142, 148
— de Castilla 53
— de jardín 147
— blanca 148
— negra 53, 137, 142 148, 151
— chiquita 148
Zorrillo 49
Zorrito 98

## BIBLIOGRAFIA BASICA

APOLINAR MARÍA, Hno. Vocabulario de los términos vulgares en Historia Natural Colombiana. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2 en adelante). Bogotá.

DEL VALLE, J. I. Introducción a la Dendrología de Colombia. Centro de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 1972.

CUERVO MÁRQUEZ, C. Tratado elemental de Botánica. Bogotá, 1913.

DUQUE-JARAMILLO, J. M. Botánica General Colombiana. Manizales ? 1943?

GARCÍA-BARRIGA, H. Flora Medicinal de Colombia. Botánica Médica. Tomo 2º. Bogotá, 1975.

GLEMBOSKY, L. L. The etnobotany of the Tukuna Indians, Amazonas, Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá, agosto 1973.

LÓPEZ-PALACIOS, S. Verbenaceae. Flora de Venezuela. Universidad de los Andes Mérida. 1977.

— Introducción a las verbenaceae para la flora de Venezuela. Rev. Fac. Farm. ULA, **13**: 7-68, 1972 y **15**: 9-126. 1975. Mérida.

— Lista de Verbenaceae de los países de la Gran Colombia... Rev. Fac. Farm. ULA, **20**: 9-40. 1979.

MOLDENKE, H. N. A. fifth Sumary of the Verbenaceae, Aviceniaceae, Stilbaceae... of the World. Wayne N. J. 1971.

— Phitologia, passim, 1 en adelante.

PÉREZ ARBELÁEZ, E. Plantas útiles de Colombia. Bogotá, 1947. Madrid. 1956.

RÉCORD, J. S. & HESS, R. W. Timbers of the New World. New Haven, 1943.

UPHOF, J. C. Th. Dictionary of economic Plants. 2ª Ed. 1968. 3301 Lehre. Verlag von J. Cramer.

URIBE, J. A. Flora de Antioquia. Editada por L. URIBE. Imprenta Departamental Medellín. 1944.

TORRES ROMERO, J. H. Contribución al conocimiento de las plantas tánicas registradas en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá. Abril 1983.